



- Nombre común:** Procesionaria del pino
- Nombre técnico:** *Thaumetopoea pityocampa*
- Planta afectada:** Especies del género *Pinus*, *Cedrus* y *esporádicamente* La

**Descripción:** Es un lepidóptero de la familia Thaumetopoeidae. El nacimiento de las orugas se inicia a la segunda semana de junio en lugares fríos, y a la segunda de julio en sitios más cálidos, y finaliza en septiembre. En un periodo de tres días efectúan las puestas, de las cuales saldrán las orugas pasadas 4-5 semanas.

Éstas viven de forma gregaria; al principio van de un sitio a otro del árbol, y cuando llega el frío construyen un bolsón-nido, de pelos sedosos de color blanco en la parte más asoleada del árbol, de donde salen cuando el tiempo es favorable para alimentarse. Durante los meses de enero, febrero y marzo (dependiendo de las condiciones climáticas) bajan de los pinos formando unas características procesiones, buscando un buen sitio para enterrarse y transformarse en crisálida.

No todas las mariposas nacen al primer año, una parte importante lo hace a los 2 o 3 años, y unas pocas en años sucesivos.

Los daños son causados por las orugas, que devoran las hojas para alimentarse; al principio se observan hojas medio comidas y secas, y después fuertes defoliaciones. Ésto provoca una disminución del crecimiento, debilidad y predisposición al ataque de insectos perforadores.

En zonas urbanizadas o frecuentadas por el hombre o animales existe una elevada peligrosidad debido a los pelos urticantes de las orugas, especialmente por lesiones en los ojos o a personas alérgicas y efecto antiestético de los árboles.







ENDOTerapia Vegetal S.L.